



I. *Pleuromyces hungaricus*, a tudományra nézve egy új és ízig-vérig hazai faj

A taxon leírói:

Viktor Papp, Balint Dima és Pierre-Arthur Moreau

/A fotó és a filogram forrása: Fungal Planet 744 – 13 July 2018/



II. A selyemgombákról (*Amanita* sp.)



Hihetetlen, hogy mennyi faj létezik ebben a szekcióban (Vaginatae).

Észak-Thaiföldön elkezdték vizsgálni és kapásból 9 fajt találtak, amely a tudomány szempontjából is új taxon.

Alább linkelem az igencsak friss cikket, amelyben az ott leírt fajokhoz határozókulcs is található.

http://www.napora.hu/gomba/MYCOSPHERE_9_3_3.pdf


/A fotókon kladogram és az egyik újonnan leírt faj, az *Amanita cinnamomea* látható./



III. 42 új taxon

40 új faj, 1 új nemzetség, 1 új család etc. - apró tömlősgombák "nyomulása" és egy szuper anyag minderről, ahogyan azt ma már a hasonló mikológiai témákban kell(ene). ;) /Mycosphere 9(2): 271–430 (2018)/
http://www.napora.hu/gomba/MYCOSPHERE_9_2_8

/A fotón az újonnan Kínából leírt, egy kicsit nagyobb tömlősgomba faj, az *Otidea pseudoformicarum* látható./



IV. Ilyen is lehet a kesernyés tinóru (*Caloboletus radicans*)

A kesernyés tinórunak lehet a tönkbázisában, rózsás-pirosas színeződése, amely jellemzője a fajnak.


Léteznek közöttük, igaz sokkal ritkábban, olyan atípusos példányok is, amelyeknél kimondottan vöröses tönkben, valamint a bázisban a hús színe és ez nem kizárólag csak az öregedés, fergesség, vagy esetleg más mikroorganizmusok rovására írható.

Panzeria korábban, az ilyen kesernyés tinórukat *Boletus sanguineipes* /Panzeria, 1997/ néven önálló taxonként tartotta számon, míg ezt megelőzően szintén Panzeria, csak a faj egy formájának *Boletus radicans* f. *sanguineipes* /Panzeria, 1996/ tekintette, holott ma már bizonyított, hogy ezek a gombák is egyértelműen kesernyés tinóruk (*Caloboletus radicans*).

Egyébiránt olvastam ritka esetekről, amikor nem érezték keserűnek ezt a fajt. Természetesen feltehetjük a kérdést, hogy ezek a ritka esetek mennyire voltak szubjektívek. ;)

/A fotókon egy atípusos *C. radicans*, valamint Jiří Polčák remek rajza a fajról és egy fenotípusos kesernyés tinóru (*Caloboletus radicans*) látható. Külön köszönet Sebestyén Ákosnak a vöröses tönkű kesernyés tinórut ábrázoló fotókért./








V. *Rhodocybe fumanellii*

A *Rhodocybe fumanellii* egy a napokban közölt új faj Olaszországból, a *Rufobrunnea* szekcióból, amely morfológiájában hasonlít a nálunk ugyancsak gyakran előforduló csalóka pereszkére (*Rhodocybe gemina* / *Clitopilus geminus*).

Valamiért mindig szerettem ezt a „pereszkrét”, de ez az új faj máris belopta magát a szívembe, hiszen a leírás alapján kicsit lisztes dióbél illata van.

A fotókon törzsfá és a *Rhodocybe fumanellii* élőhelyi fotója látható.

/Forrás: A new species of *Rhodocybe* sect. *Rufobrunnea* (Entolomataceae, Agaricales) from Italy - MycoKeys 36: 21–33 (2018)/





MikoChips Vol. 3. (2018. július 21.) - Vrba György

<http://www.napora.hu/elemek/egyeb.html>